PROPUESTA SUPLEMENTACIÓN NUA PARA COVID-19

FASE 1
Infección activa (la batalla)

COVID-19 'Activo'

- Compromiso respiratorio
- Inflamación ('tormenta de citoquinas')
- Daño endotelial y neurológico
- Trombos diseminados

Choque (duración min. 1-2 meses)

- **Reishinua® bebible/caps**
  - 1 vial- 2 caps- 2 caps ó
  - 2 caps- 2 caps- 2 caps (antes de las comidas)

- Min. 2 **NuaEPA®1200**/día (1-1-0 ó 0-1-1 con comidas), Opcional-ideal (4/día): 1-1-2

ó

- Min. 2 **NuaDHA®1000**/día (1-1-0 ó 0-1-1) (con comidas), Opcional-ideal (4/día): 1-1-2

FASE 2
Post-infección y recuperación (tras la batalla)

Post COVID-19

- Nutrición y refuerzo función respiratoria
- Resolución inflamación "silente"
- Recuperación endotelial y neurológica
- Reducción sobrecarga radicales libres

Afianzar recuperación
(duración: 2 meses)

- **Reishinua® bebible** 1 vial/día (con agua/zumo antes del desayuno; 1-2 meses)

- **NuaEPA®1200**
  - 2/día(1-1-0 ó 0-1-1) 2 meses (con comida)

y

- **NuaDHA®1000**
  - 2/día (1-1-0 ó 0-1-1)2 meses (con comida)

- **Hidroxinua®25** 2/día (1-0-1) 2 meses (con comida)

FASE 3 (final)

Homeostasis

- Resolución inflamación
- Retorno a la normalidad

nua biological